



口服懸浮液

Oral Suspension

【說明】

胃逆舒口服懸浮液於服用後在胃中與胃酸發生反應，形成一種酸鹼度幾近中性的漂浮黏膠，能有效阻止胃液逆流，因此可緩解因胃酸或膽汁逆流至食道所導致的症狀，如：消化不良、逆流性食道炎、反胃、上腹及胸骨後疼痛等。

【成分】每毫升含

有效成分及含量： Sodium Alginate..... 50 毫克

Sodium Bicarbonate..... 26.7 毫克

Calcium Carbonate..... 16 毫克

(本藥品每10毫升劑量中鈉含量為6.2mEq，單次劑量之鈉含量為6.2-12.4 mEq)

其它成分(賦形劑)： Methylparaben, Propylparaben, Sucralose, Carbomer934P, Sodium Hydroxide, Edetate Disodium, Essence of Strawberry, Purified Water

【用途(適應症)】

緩解胃酸及膽汁反流入食道中所產生之疼痛。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：

1. 2歲以下。
2. 曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

1. 消化道潰瘍的人。
2. 須限鹽飲食的人。
3. 有高血壓、心臟病、腎疾、腹水、水腫的人。
4. 兩歲至六歲以下。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

1. 孕婦、可能懷孕婦女。
2. 與其他藥品併用時。

四、其他使用上注意事項：

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射。
3. 勿超過建議使用量。
4. 一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。
5. 如長期與鈣質牛奶併用，會引起高血鈣、腎衰竭、鹼中毒、噁心、嘔吐、頭痛、意識不清、厭食等現象。
6. 腎臟病患者使用高劑量會引起鹼中毒：會加重高血壓、心衰竭、腎衰竭、水腫、腹水。
7. 可能引起腹脹、打嗝。
8. 使用前須搖勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
9. 本藥成分(Alginate)不會被腸胃道吸收，因此哺乳婦女可以服用。
10. 本藥為物理性的藥物治療方式，藥物過量的危險性極低，是一種有效的保守療法，但仍可能有腹脹等腸胃道副作用。

【用法用量】

年齡	每次服用量	一日服用次數
12歲以上	10 - 20毫升	一天3 - 4次，飯後及睡前服用，服用前請搖勻。
6 - 12歲	5 - 10毫升	
2 - 6歲	5 - 10毫升， 使用前請洽醫師診治	
2歲以下	不建議使用	

【警語】

服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

部位	副作用
腸胃道	腹脹、打嗝、腹瀉

服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 若有任何不適情況產生。
2. 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】 4,000 毫升以下塑膠瓶裝。

【類別】 醫師藥師藥劑生指示藥品。

【劑型】 懸浮劑，口服白色懸浮液，草莓口味。

【儲存方法】 請儲存於 25 °C 以下，並無需冷藏。

委託者：**TTY BIOPHARM** 台灣東洋藥品工業股份有限公司
台灣東洋藥品 TTY Biopharm Co., Ltd

地址：11503台北市南港區區街3-1號3樓

電話：(02)2652-5999

製造廠：晟德大藥廠股份有限公司新竹廠
Center Laboratories Inc.

地址：新竹縣湖口鄉實踐路2號

